

<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>LOKOMOTIVE®</b>
<b>COMPOSICIÓN % p/v</b>	32,4% K <sub>2</sub> O
<b>FORMULACIÓN</b>	Concentrado Soluble
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Fertilizante
<b>FABRICANTE/FORMULADOR</b>	Loveland Products Inc. Estados Unidos
<b>TOXICIDAD</b>	Se considera no tóxico
<b>REGISTRO SAG</b>	No corresponde
<b>PRESENTACIONES COMERCIALES</b>	20 L

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante foliar Líquido 100% soluble, con alta concentración de Potasio en base a acetato de potasio. Favorece el calibre y color de los frutos, respondiendo a la alta demanda de potasio en el último tercio de crecimiento de los frutos y hortalizas sin afectar negativamente la post-cosecha.

### INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Dosis	Observaciones
Manzano, Peral	0,4 – 0,6 Litros / 100 L de agua	Aplicar al inicio de fructificación. Repetir a intervalos de 14 días.
Nogal, Almendro, Avellano Europeo	0,3 – 0,5 Litros / 100 L de agua	Aplicar 3 veces antes de cosecha a intervalos de 10 a 15 días.
Duraznero, Nectarín, Ciruelo, Damasco	0,3 – 0,5 Litros / 100 L de agua	Durante la formación del carozo, crecimiento y llenado de frutos. Repetir si es necesario cada 14 días.
Cerezos	0,3 – 0,5 Litros / 100 L de agua	Durante la formación del carozo, crecimiento y llenado de frutos. Repetir si es necesario cada 14 días.
Cítricos, Limonero, Naranja, Mandarino	0,3 – 0,5 Litros / 100 L de agua	Con fruto presente. Repetir a intervalos de 14 días.
Kiwi	0,3 – 0,4 Litros / 100 L de agua	Durante el desarrollo del fruto. Repetir a intervalos de 14 días.
Palto	0,3 – 0,5 Litros / 100 L de agua	Con fruto presente. Repetir a intervalos de 14 días.
Olivo	0,4 – 0,6 Litros / 100 L de agua	Desde fruto cuajado. Repetir a intervalos de 14 días.
Uva de mesa y vinífera	0,2 – 0,4 Litros / 100 L de agua	Empezar al cierre de racimos. Aplicarlo cada 15 días.
Frambuesas, Arándano, Cranberries, Murta, Zarparrilla, Grosella	0,3 – 0,4 Litros / 100 L de agua	Aplicar desde fruto cuajado cada 15 días.
Papa	2 – 4 Litros / ha	Aplicar cada 10 a 15 días desde tuberización. Repetir y utilizar dosis mayores desde floración en llenado de tubérculos.
Zanahoria	2 – 4 Litros / ha	Aplicaciones quincenales a partir de 50 días después de la siembra.
Coliflor, Brócoli, Repollo	3 – 4 Litros / ha	Aplicaciones semanales a partir de los 40 días.
Cebolla, Ajo	2 – 3 Litros / ha	4 - 6 aplicaciones a partir de 60 a 70 días después del establecimiento.
Melón, Sandía, Zapallo, Zapallo italiano	3 – 5 Litros / ha	Aplicar con fruto recién cuajado. Repetir 1 a 2 veces en llenado de frutos.
Tomate, Pimiento	2 – 3 Litros / ha	Aplicar cada 7 días después de 50 días post trasplante.
Poroto, Soja, Lenteja, Garbanzo, Habas, Arvejas	2 – 3 Litros / ha	Aplicar desde inicio de formación de vainas.
Frutilla	3 – 4 Litros / ha	Aplicar cada 10 a 14 días desde inicio de fructificación.
Apio, Lechuga	2 – 3 Litros / ha	Aplicar 20 a 30 días post trasplante. Repetir cada 7 días.

Remolacha, Achicoria	2 – 3 Litros / ha	Aplicar desde inicio de cerrado de la entrehilera.
Raps	3 - 4 Litros / ha	Aplicar desde inicios de elongación del tallo floral.
Trigo, Avena, Cebada, Triticale, Arroz, Maíz.	2 – 4 Litros / ha	Desde macolla a espiga embuchada.

Importante: En fertirrigación, las dosis pueden cambiar conforme a la necesidad del cultivo en cada una de las fases de desarrollo.

#### **PRECAUCIONES**

**Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los fertilizantes líquidos, micronutrientes y pesticidas, sin embargo se recomienda efectuar un ensayo de compatibilidad a pequeña escala. cuando se mezcle con pesticidas, diluya **LOKOMOTIVE®** con agua antes de la adición de agentes estabilizadores de ph (soluciones tampón y de pesticidas).

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**Tiempo de Reingreso:** Sin restricción.

**Período de Carencia:** No corresponde.