

<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	MAXIMUM N-PACT®
<b>COMPOSICIÓN % P/V</b>	25% N Total
<b>FORMULACIÓN</b>	Concentrado Soluble
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Fertilizante
<b>FABRICANTE/FORMULADOR</b>	Loveland Products Inc. Estados Unidos
<b>TOXICIDAD</b>	Se considera no tóxico
<b>REGISTRO SAG</b>	No corresponde
<b>PRESENTACIONES COMERCIALES</b>	20 L

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fertilizante líquido para aplicación foliar y fertirriego, compuesto por una parte de Nitrógeno disponible en forma inmediata y otra de lenta entrega, lo que permite menor parcialización de las aplicaciones.

### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/ha	Nº APP.	ÉPOCA DE APLICACIÓN
<b>FRUTALES</b>			
Limón, Naranja, Mandarino, Pomelo, Olivos, Paltos	5 a 20	1	Aplicar a inicio de brotación.
Uva de mesa, Uva vinífera	5 a 20	1	Aplicar a inicio de brotación, repetir en post-cosecha.
Durazno, Damasco, Cerezos	5 a 20	1 a 2	Aplicar a inicio de brotación, repetir en post-cosecha.
Ciruelo	5 a 20	1 a 2	Aplicar a inicio de brotación, repetir en post-cosecha.
Manzanas, Peras	5 a 20	1 a 2	Aplicar a inicio de brotación, repetir en post-cosecha.
Nogales, Almendro, Avellano Europeo	5 a 20	1 a 2	Aplicar a inicio de brotación, repetir en post-cosecha.
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora, Cranberry	5 a 20	1 a 2	Aplicar a inicio de brotación, repetir en post-cosecha.
<b>HORTALIZAS Y CULTIVOS</b>			
Tomate, Pimentón	5 a 10	2 a 3	Aplicar durante la etapa de crecimiento vegetativo, repetir durante el desarrollo de fruto.
Lechuga	5 a 10	1	Aplicar 15 a 20 días post trasplante.
Papa	5 a 10	1	Aplicar 20 días después de la emergencia.
Maíz	5 a 20	1 a 2	Aplicar con 6 a 8 hojas verdaderas, repetir si es necesario antes de la emisión de panoja.
Trigo, Avena, Cebada	5 a 20	2	Aplicar dosis máxima a inicio de encañado repetir a inicio de espiga (5 a 10 L/ha).
Cebolla, Ajo	5 a 10	1 a 2	Aplicar durante la etapa de crecimiento vegetativo.
Sandía, Melón, Zapallo	5 a 10	1 a 2	Aplicar durante la etapa de crecimiento vegetativo.
<b>VIVEROS Y FORESTALES</b>			
Viveros	5 a 10	1 a 2	Aplicar a inicio del crecimiento vegetativo (solución al 1 o 2%).
Forestales (Pino, Eucaliptus)	20 a 30	2	Aplicar a inicio de crecimiento vegetativo, repetir a los 60 días.

Importante: En fertirrigación, las dosis pueden cambiar conforme a la necesidad del cultivo en cada una de las fases de desarrollo.

### PRECAUCIONES

**Compatibilidad:** MAXIMUN N-PACT® es compatible con la mayoría de los fertilizantes líquidos, micronutrientes y pesticidas, sin embargo se recomienda efectuar un ensayo de compatibilidad a pequeña escala. Cuando se mezcle con pesticidas, diluya MAXIMUN N-PACT® con agua antes de la adición de agentes estabilizadores de pH (soluciones tampón y de pesticidas).

**Fitotoxicidad:** este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

**Tiempo de reingreso:** Sin restricción.

**Período de carencia:** No corresponde.