NOMBRE COMERCIAL **NUTRIPLANT®**

COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N)	11.0 %	Azufre (S)	0.23%
Fósforo (P_2O_5)	8.0 %	Manganeso (Mn)	0.04%
Potasio (K_2O)	6.0 %	Cobalto (Co)	0.002%
Fierro (Fe)	1.0 %	Molibdeno (Mo)	0.005%
Zinc (Zn)	1.0 %	Clorhidrato de Tiamina	0.004%
Boro (B)	0.04%	Agentes de Penetración	0.50%
Calcio (Ca)	0.25%	Folcisteina	0.28%
Magnesio (Mg)	0.25%	Activadores Metabólicos	0.01%
Cobre (Cu)	0.04%		

FORMULACIÓN Suspensión homogénea.
GRUPO QUÍMICO Fertilizante
FABRICANTE/FORMULADOR Química Sagal. México.
TOXICIDAD Ligeramente tóxico.
REGISTRO SAG No corresponde
ANTÍDOTO No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
PRESENTACIÓN COMERCIAL 1 - 20 L

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

NUTRIPLANT PLUS® es un fertilizante foliar completo perfectamente balanceado que contiene todos los elementos mayores, secundarios y menores en forma de quelatos, además de vitaminas, fitohormonas, agentes de penetración y ácido húmico, necesarios para aumentar el rendimiento y calidad de su cosecha. La quelatación de los elementos menores permite que estos sean asimilados y utilizados por la planta de forma rápida y no sean bloqueados por elementos que estén en mayor concentración. El complejo hormonal permite una activación del metabolismo de la planta para lograr una eficiente utilización de los elementos nutricionales y por consecuencia lograr un efecto positivo en las plantas**.**

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivos	Dosis L/ha(*)	Dosis y Época de aplicación
Cereales: Maíz, Trigo, Sorgo, Arroz, Cebada	1-2	1a. 15 a 20 días después de la emergencia. 2a. Al inicio del embuche. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
Hortalizas: Tomate, Ají y Pimentón	1-2	1a. 15 a 20 días después del trasplante. 2a. 10 días después. 3a. Al inicio del botón floral. Subsecuentes cada 20 días a partir del 1er corte o cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
Papa	1-2	1a. Al inicio de la formación de los estolones. 2a. Al inicio del crecimiento de los tubérculos. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
Leguminosas y oleaginosas: Soya, Poroto y Maní	1-2	1a. 15 días después de la emergencia. 2a. Al inicio del botón floral. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.

Cultivos	Dosis L/ha(*)	Dosis y Época de aplicación
Palto, Manzano, Durazno, Nogal, Kiwi, Cerezo.	1-3	1a. Inicio del rebrote de las hojas. 2a. Al desarrollo de los frutos. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
Naranjo y Limón.	1-3	1a. Inicio del rebrote de las hojas. 2a. Al desarrollo de los frutos. Subsecuentes cuando haya deficiencias y/o déficit de desarrollo.
Cucurbitáceas: Melón, Sandía, Zapallo, Pepino.	1-2	1a. 15 días después de la emergencia. 2a. 10 a 15 días después. Subsecuentes cada 8 días después del primer corte o cuando haya deficiencias y/o déficit de crecimiento.
Alfalfa	1-2	Aplicar después de cada corte cuando haya hojas verdaderas.
Coliflor, Lechuga, Espinaca, Brócoli y Tabaco.	1-2	1a. 10 días después de la emergencia. 2a. 7 días después. 3a. Al inicio de la formación de meristema vegetativo (brócoli y coliflor). 4a. 7 días después.
Berries: Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora y Zarzamora	1-3	1a. Inicio de desarrollo de nuevos brotes. 2a.Después de cada cosecha. 3a. Subsecuentes cada 10-15 días.
Cebolla y ajo	1-2	1a. Aplicar cuando haya de 7 a 9 hojas. 2a. Inicio desarrollo del bulbo.
Uva de mesa	1-3	1a. Inicio de brotación de hojas. 2a En prefloración. 3a. Postcosecha.
Ornamentales: Rosa, Crisantemo y Clavel	1-2	1a. Al inicio del rebrote de las hojas. 2a. 10 a 15 días después. Subsecuentes cada tres semanas.

(*) Dosis bajas en inicio de desarrollo de cultivo y dosis alta en crecimiento máximo de cultivo.

PRECAUCIONES

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas y herbicidas. Sin embargo, es recomendable realizar pruebas previas antes de utilizarlo en la práctica.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

Tiempo de Reingreso: Sin restricción.

Período de Carencia: No corresponde.